

tantes les unes des autres. Spire allongée, à sommet lisse, obtus et renflé, comme mamelonné. Dix à onze tours peu convexes, séparés par une suture assez profonde. Les deux premiers tours sont lisses, tandis que tous les autres sont munis de fortes côtes. Le dernier tour, contracté, rétréci, aplati, se détache d'une manière remarquable (1 à 1 millimètre 1/2) de l'axe de la spire. Ce dernier tour possède à sa base deux petites arêtes cervicales qui ne se rejoignent point vers l'ouverture, mais qui se tiennent à peu près à égale distance l'une de l'autre. L'arête cervicale supérieure, très-saillante, comprimée, un peu crénelée, est plus longue et plus forte que l'autre.

Ouverture très-grande, de forme arrondie, intérieurement blanche, offrant à sa partie supérieure deux lamelles. La première est marginale et de faible taille; la seconde, au contraire, est plus forte, plus contournée, et plus enfoncée dans l'intérieur. Péristome continu, complètement libre et largement réfléchi de tous côtés.

Longueur . . . . . 15 millimètres.

Diamètre . . . . . 3-4 —

Cette magnifique espèce habite, en Syrie, les montagnes qui bordent la vallée du Nahr-el-Kelb, à une distance de 7 kilomètres de l'embouchure de cette rivière.

Cette Clausilie, recueillie par M. Léon Raymond, capitaine de gendarmerie, prévôt de l'expédition de Syrie en 1860, est assez abondante sur les rochers dans cette localité.

N. B. Les planches relatives à ce Mémoire paraîtront dans le numéro suivant.

DESCRIPTION de Cicindèles et de Carabiques nouveaux,  
par le baron DE CHAUDOIR.

*Tricondyla crebrepunctata*, long. 20-24 m. Nigra, elytris opacis subæneis, thoracis parte intermedia antèrius cras-

siore, elytris postice valde gibbosis, sat ampliatis, ubique creberrime punctatis, antice rugulosis, femoribus palporumque basi rufo-ferrugineis. *Tr. cyanea* major, differt colore nigro, subæneo, spatio inter sulcos frontales paulo latiore, elytris crebrius at subtilius punctatis, rugis baseos obsoletioribus, antennis pedibusque longioribus.— Siam, de Castelnau. ♂

*Collyris subtilis*, long. 11 m. Viridi-cyanea, gracilis, antennis pedibusque tenuissimis, modice elongatis, capite elongato, pone oculos vix prominulos subattenuato, thorace postice vix strangulato, posterius vix inflato, anterius sensim attenuato, elongato-conico, villosulo, antice strangulato, obsolete transverse striato; elytris angustis, subtilissime punctulatis, apice sublævibus, subdentatis, antennis basi cyaneis, medio longius luteis, apice piceis, palpis piceis, labialium stipite diluto, pedibus cyaneo-obscuris, femoribus rufis, apice supra cyaneo-lineato. *C. maculicornis* m. summa affinitas, differt antennis basi et apice obscuris, palpis fere totis piceis, femorum apice cyaneo-lineato, tibiis et tarsis cyaneis, capite pone oculos longiore, his magis depressis, elytris apice sublævibus et dentatis, nec rotundatis (tarsi postici desunt). Siam, de Castelnau.

*Carabus invictus*, long. 28 m. Niger nitidus, thorace violaceo, elytris viridibus, nigro-costatis, violaceo-marginatis. *Caput* modicum, obsolete rugulosum, clypeo lævi, oculis prominulis; *thorax* capite fere duplo latior, subtransverso-quadratus, postice vix angustior, lateribus anterius parum rotundatis, posterius rectis, tenuiter marginatis, vix reflexis, basi vix emarginata, angulis posticis perparum productis, latis, rotundatis, apice vix deflexis, supra levissime excavatis, dorso planiusculo, subruguloso, linea media modice impressa; *elytra* thorace paulo latiora, modice elongato-ovata, basi callo distincto, humeris parum prominulis (magis attamen quam in *iberico*), rotundatis, apice subtruncate-rotundato, anum non tegente,

anteriorius modice angustata, dorso planiusculo, apicem versus non declivis, juxta suturam subexcavato-depresso, hac, costis in singulo duabus parum elevatis, tuberculisque triplici serie obtusiusculis, subnitidis, basin apicemque attingentibus, margine anguste ruguloso, sat reflexo, inter costas tuberculorumque series striæ binæ subpunctatæ, interjecto interstitio angustulo parumque elevato; *antennæ* haud nodosæ, dimidio corpore longiores, palporum apex parum securiformis, *pedes* valde elongati, validiusculi, femoribus anticis sat incrassatis, tarsi antici maris articulis quatuor satis dilatatis, subtus spongiosis. *Car. Lafertei* m. affinis, minor, caput et thorax multo læviora, hujus lateribus multo minus subtiliusque marginatis, elytra planiora, apice haud excisa, obtusiora, omninoque aliter sculpta. Armenia alpina, Moritz Wagner.

J'ai reçu ce rarissime Carabe de M. Hampe qui en possédait deux individus seulement. Le mien est un mâle, que j'ai comparé aux mâles des *Carabus iberus* et *Lafertei*.

On a énoncé l'opinion que le *C. Lafertei*, dont le *refulgens* m. n'est qu'une variété de couleur et plus large, ne différerait pas spécifiquement de l'*iberus*. Je dois cependant observer que le *Lafertei* est sensiblement plus allongé; sa tête et son corselet sont beaucoup plus rugueux, celui-ci est moins court, ses angles postérieurs sont bien plus relevés et ne se replient pas en dessous comme dans l'*iberus*, ses élytres sont moins rétrécies à leur base, les épaulés sont moins effacées, l'extrémité est tronquée plus obliquement et plus sinuée; leur sculpture est aussi différente et se compose d'intervalles à peu près égaux en largeur, dont les uns sont alternativement interrompus, et les autres ne le sont pas, et l'on ne voit pas, comme dans l'*iberus*, de gros points enfoncés; les stries se prolongent plus vers la base qui n'est pas aussi lisse; les antennes et les pattes sont sensiblement plus allongées (tous en comparant les mâles). J'ai pris l'*iberus* sur le

sommét le plus élevé d'une montagne de la chaîne centrale du Caucase près de Kwischet, à la limite des neiges éternelles, tandis que le *Lafertei* se trouve sous les troncs d'arbres à une élévation de 5 à 600 pieds, non loin d'Abbas-Touman dans les montagnes voisines de l'Asie Mineure et distantes de plus de 200 lieues.

*Carabus coriaceipennis*, long. 26 m. Niger, opacus, elytrorum sculptura insignis, a *C. Mannerheimii* differt capite paulo longiore, thorace ampliore, longiore, basi paulo latiore, antice evidentius angustato, lateribus postice rectis parallelis, angulis posticis magis productis, apice rotundatis, extus altius reflexis, elytris paulo latioribus, parallelis, subtiliter granulato-coriaceis, triseriatim tuberculatis, tuberculis elongatis, nitidis, parum elevatis, inter singulam seriem series binæ e granulis rotundatis, nitidis, subelevatis, cætera granulatione grossioribus. Antennæ ut in *Mannerheimii* nodosæ. China borealis. A. Deyrolle dedit.

*Carabus brevisformis*, long. 23 m., lat. elytr. 10 m. Niger parum nitidus. *C. Kruberi* proximus, ejusdem varietate latiuscula (*Bungii*) adhuc latior, differt antennis articulis singulis longioribus, thorace multo subtilius punctulato, postice minime angustato, latiore, lateribus magis explanato-reflexis, angulis posticis multo magis productis, apice obtuse acutis, elytris convexioribus, humeris magis quadratis, subrectis, rotundatis, lateribus magis rotundatis, margine laterali præsertim antèrius latius altiusque reflexo, minus dense granulato, striis numerosis simplicibus, subinterruptis, interstitiis omnibus frequenter et valde irregulariter interruptis, apicem versus convexioribus, punctis nonnullis utrinque juxta strias impressis; corpore subtus omnino impunctato, lævi, pedibus longioribus. Dsungaria, Karélin.

*Calosoma viridi-sulcatum*, long. 27 m. Nigrum, subopacum, capite rugoso-punctato, in foveis virescente, vertice lævi subincrassato, oculis modice prominulis; thorace

capite duplo latiore, antèrius angustato, apice parum emarginato, angulis anticis capiti annexis, acutis, parum prominulis, lateribus æqualiter rotundatis, basi media recte truncata, angulis posticis subproductis, late rotundatis, supra late profundiusque excavatis, lateribus antice angustius, postice latius explanato-reflexis, dorso parum convexo, antèrius obsolete, posterius evidenter minus dense punctulato; utriusque postice subfoveolato, linea media tenuissima, impressionibus transversis vix ullis, intra marginem et in excavationibus virescente; *elytris* thorace paulo latioribus, latitudine fere duplo longioribus, ovatis, basi truncatis, apice conjunctim acuminate rotundatis, humeris convexis rotundatis, lateribus medio subrectis, dorso valde convexis, sutura angusta, costisque in singulo quatuor latis deplanatis apice confluentibus nigris; interstitiis multo angustioribus, depressis, biserialiter striato-punctatis, vittaque intramarginali seriatim tuberculata viridi-cyaneis, ipso margine epipleurisque nigris; *abdominis* lateribus punctatis. Mexique intérieur, Dohrn.

*Loricera rotundicollis*, long. 8 m. A *L. pilicorni* differt oculis minus prominulis, antennis gracilioribus, articulo primo majore subclavato, thorace lateribus magis reflexo, angulis posticis magis rotundatis, basi punctulata, utrinque excavata, non vero lineatim impressa, *elytris* longioribus, ovatis, humeris omnino rotundatis, haud quadratis, striis profundioribus, postice extusque vix punctatis, pedibus longioribus et gracilioribus, colore obscure piceo, vix metallescente, *elytris* interdum rufescentibus. Mexique (État d'Oaxaca, Capulalpam, en juin), A. Sallé.

*Scariphites lucidus*, long. 22 m. Ebeninus, nitidissimus; *capite* subtransverso-quadrato, lævi, fronte subbi-foveolata, clypeo utrinque striatulo et foveolato; *thorace* cordato, apice profunde emarginato, angulis productis summo apice subrotundatis, basi valde angustata, lateribus regulariter rotundatis, ad angulos posticos breviter



sinuatis, his rectis subobtusis, basi subrecte truncata, utrinque subobliquata, dorso planiusculo, lævissimo, linea media tenui vix impressa, juxta apice in præcipue medio obsolete transverse lineato, utrinque ante basin linea longitudinali subrecta obsolete impressa, lateribus basique tenuiter marginatis; *elytris* latitudine thoracis, breviter ovatis, basi truncata, medio emarginata, humeris marginatis descendentes, extus subobtusè dentatis, lateribus modice rotundatis, apice rotundato, haud acuminato, supra lævissimis, striis nullis, sutura impressa, margine laterali tenuiter reflexo, antè subexplanato, intra marginem serie e tuberculis ocellatis continua, pone medium intra seriem punctis majoribus tribus ocellatis piliferis, margine apiceque subopacis. Melbourne, S. Stevens.

*Passalidius afer*, long. 31 m., lat. 9 m. Niger opacus, *capite* transverse quadrato, lævi, fronte undulata et carinulata, clypeo quadricornuto, cornubus breviusculis; *thorace* capite paulo latiore, latitudine dimidio breviorè, antè subdilatato, apice modice emarginato, angulis anticis truncatis, truncaturæ angulis rotundatis, lateribus rectis, fere parallelis, angulis posticis basique late rotundatis, hac medio haud producta, recte truncata, dorso modice convexo, lævi, medio tenuiter lineato, pone apicem transverse haud impresso, juxta angulos subrugato, longius ante basin utrinque unipunctato, ibique linea transversa sinuata impresso, margine laterali minus late acute reflexo, intra marginem serie punctorum impressa; scutello trigono, postice lævi, utrinque unipunctato; *elytris* latitudine thoracis, quam lata fere duplo longioribus, basi truncata medio subemarginata, humeris rectis sat rotundatis, lateribus parallelis, apice obtuse rotundato, dorso medio modice convexo, ad latera abruptius, ad apicem fere verticaliter declivi (ut in *Scapteris ingenuis*), intra marginem anguste, apice longius granulato, striis tribus internis obsolete, cæteris sulciformibus, om-

nibus apice abbreviatis, interstitiis primis planissimis, lævibus, quinto, sexto, septimo et octavo acute carinatis, imprimis octavi basi, postice abbreviatis, haud confluentibus, sulcis inter carinas latiusculis, lineatim granulatis; *subtus* lævis, nitidus, ano postice fortius rugato, tibiis intermediis extus unicalcaratis, posticis extus medio dilatatis. Port-Natal.

*Passalidius Andersonii*, long. 40 m., lat. 12 m. Præcedenti simillimus, multo major, imprimis latior, fronte rugulis intricatis acutiusculis dense tecta, thorace antice magis dilatato, margine laterali frequenter indentato, latus reflexo, apice utrinque fortius rugato, medio substriato, lateribus rugiferis, foveis basalibus elongatis, divergentibus, elytris latioribus, minus elongatis, apice obtusius rotundatis, striis internis magis punctatis, sulcis externis evidentius granulatis. Lac N'gami, Anderson.

Le menton à lobes aigus, muni, au milieu de son échancrure, d'une grande dent tronquée un peu bifide, les courtes mandibules à dents internes relevées en corne (la mandibule gauche obtuse et ne dépassant pas la base de la deuxième corne, de manière à n'y former qu'une échancrure), la brièveté des articles des antennes à l'exception du premier qui est long, mais tout à fait caché dans la rainure suboculaire; la saillie remarquable des joues en dessous des yeux et qui les dépasse sensiblement en formant une carène tranchante arrondie, la déclivité presque verticale de l'extrémité des élytres (à peu près comme chez les vrais *Scapterus*) et quelques autres caractères tirés de la conformation des pattes, ont nécessité pour ces deux espèces la création d'un genre nouveau, sur lequel je me propose de revenir par la suite. Le nom fait allusion à sa ressemblance avec les *Passalus*.

*Scapterus sulcatus*, long. 13 m. *Sc. Guerinii* summa affinitas, differt statura minore et angustiore, cornu frontali minore et acutiore, capite fortius rugato, thoracis disco lateribus magis punctato, foveis basalibus profun-

dioribus, elytris apice minus truncatis et magis rotundatis, sulcatis, sulcis latiusculis foveatis, interstitiis valde convexis, lævigatis. India orientalis borealis, D<sup>r</sup> Bacon.

*Scapterus* (spurius) *Dohrnii*, long. 15 1/2 m. Habitu *Sc. longicollis* Putzeys simulat, multo vero major, robustior, caput grossius obtusiusque rugatum, thorax adhuc longior, angulis anticis magis productis, disco anteriore lævi, fovea basali brevissima, elytra breviora, humeris rotundatis, haud dentatis, disco convexiore, striis obsolete punctatis, interstitiis latioribus, subconvexis, lævigatis, tertio, quinto et septimo tri aut quinque punctatis, ano medio latius haud punctato. Java, Dohrn.

*Scapterus crenatus*, long. 15 m. Habitu et magnitudine omnino præcedentem refert, differt capite non rugato at valde inæquali, thorace breviora crassioreque, angulis anticis vix productis, obtusiusculis, lateribus ad angulos anticos subincurvis; elytris subovatis, paulo latioribus, striis in fundo grosse crenatis, interstitiis convexioribus, haud serie punctatis, secundo, quarto sextoque apice abbreviatis, cæteris ibidem connectis intricatis, abdomine lateribus grossius punctato. Cochinchina, Doüé.

Ces deux derniers ainsi que le *Sc. longicollis* n'appartiennent que très-imparfaitement au genre *Scapterus* dans lequel je ne les maintiens que provisoirement; l'extrémité des élytres est tout autrement conformée.

*Listropus discophorus*, long. 7 1/2 m. Mâle. Rufo-piceus, elytris testaceis macula media suturali rotundata obscura, antennis, palpis pedibusque ferrugineis; a *L. brevicorni* præter colorem differt magnitudine multo minore, statura paulo angustiore, capite regulariter acuteque octocarinato, oculis minus prominulis, thorace antice minus dilatato, angulis anticis obsoletius auriculatis, apice subtilissime striato, foveis basalibus linearibus longioribus, elytris convexioribus, humerorum dente interno acutiore, regulariter ovatis, nec versus apicem attenuatis. Bolivia (Valle Grande), Guérin-Ménéville.



*Agridia guyanensis*, long. 17-23 m. Nigro-picea, nitida, capite palpis, antennais pedibusque rufo-piceis, elytris subæneis; *caput* elongato-ovatum, pone oculos longius productum, in mare magis attenuatum, oculis prominulis, læve, subdeplanatum; *thorax* latitudine capitis, eoque haud longior, pone medium ampliatis, lateribus medio subrotundatis, ante apicem sinuatis, ante basin modice excisis; dorso subdeplanato, transverse subtiliter strigoso, utrinque obtuse carinato, carinis basi brevius, apice longius abbreviatis, lævibus, linea interna juxta carinas dorsoque hinc inde punctatis, linea media fere obsoleta, basi transverse impressa, prosterno omnino lævi; *elytra* capite cum thorace paulo longiora, hoc plus duplo latiora, pone medium perparum ampliata, humeris rectis rotundatis, apice oblique truncato vix emarginato, extus et ad suturam acute bidentato, dorso convexa, striis e punctis grossioribus modice approximatis, interstitiis planiusculis, lævibus, tertio quintoque ad strias pluripunctatis; *pectus* et *abdomen* in utroque sexu lævia glabraque. *A. platyscelis* summa similitudo, differt capite fœminæ postice minus crasso, elytris haud impresso-striatis, striarumque punctis remotis. Guyana gallica occidentali, de Bonvouloir, A. Deyrolle.

*Agridiarubricollis*, long. 13 1/2 m. Fœmina. Nigro-picea, capite piceo, thorace et femoribus rubro-sanguineis, antennis rufo-variegatis, elytris læte cyanescente-viridibus, subæneis; *caput* elongato-quadratum, convexiusculum, læve, basi abrupte strangulatum; *thorax* pone medium crassior, anterieus sensim modice attenuatus, ante basin et apicem obsolete strangulatus, minus grosse densius punctulatus, lateribus obsolete carinatis, dorso convexo, linea media tenuissima haud depressa; *elytra* corporis parte anteriore longiora, cylindrica, humeris sat convexis, lateribus parallelis, apice sat oblique emarginato-truncato, acute bidentato, striarum punctis subtransversis, interstitiis planis subrugosis. Ab *Agridia Batesii* differt colore

præcipue capitis femorumque, capite pone oculos magis quadrato, thorace brevior magis punctato, elytris latioribus, humeris magis prominulis, apice oblique truncato bidentatoque. Brasilia, Putzeys.

(*La suite prochainement.*)

COLÉOPTÈRES NOUVEAUX appartenant à la faune d'Espagne,  
par M. L. M. SCHAUFFUSS.

*Heterius Marseulii*. Ferrugineus, convexus, nitidus, punctis piliferis rarissimis; thorace brevi, antice angustato, utrinque sulcato, lateribus rectis; elytris subtiliter striatis, striis posticæ abruptis.

Patria : Hisp. centr.; long. 1 1/2 mill., lat. 1 1/3 mill.

*Platicerus spinifer*. Cæruleus vel viridi-æneus, nitidulus; thorace angulis posterioribus rectis; elytris irregulariter striato-punctatis, interstitiis ruguloso-punctatis; antennarum clava quadri-articulata; tibiis anticis in utroque sexu tri-vel quatuor, posticis in medio uni-majoribus spinosis.

Patria : Hisp. centr.; ♂, long. 14 mill., lat. 5 mill. —  
♀ à 9 mill., ♂ à 3 1/2 mill.

*Campilus Kiesewetteri*. Elongatus, punctulatus, cinereo-pubescent; fronte fortiter triangulariterque impressa, antice rotundatim carinata, deflexa, utrinque elevata; oculis rotundatis, prominulis, nigris; thorace elongato, lateribus post medium parum emarginatis, basi rotundato-impresso, ante scutellum sub-bifoveolatum, trisinuato, utrinque ad angulo bidentatis, angulis posticis obtusis; elytris longioribus, punctato-striatis, interstitiis planis, punctulatis; antennis pedibusque pallidis. ♀ testaceus, interstitiis deplanatis, long. 14 mill., lat. 4 2/3 mill. ♂ ferrugineis, sutura margineque testaceis; long. 11 mill., lat. 3 mill. Patria : Hisp. centr.

*Elater aurilegulus*. Ater, subtus cinereo-pubescent, elytris coccineis, aureo-pilosis; thorace nigro-piloso, dense